

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 463

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL :

85,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.  
Sous-Régisseur de Recettes  
du Service de la Protection  
des Végétaux  
Cité Administrative - Rue Pélissier  
63034 Clermont Ferrand Cedex  
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN n° 32 du 12 NOVEMBRE 1982 - EDITION GENERALE

## GRANDES CULTURES

### CEREALES

#### ORGE D'HIVER

Les stades phénologiques sont les suivants :

- début tallage : semis première décade d'Octobre
- 2 à 3 feuilles : semis plus tardifs

#### JAUNISSE NANISANTE

De nouvelles prospections ont été réalisées plus particulièrement dans le département de l'ALLIER où les risques d'inoculation de la maladie sont les plus importants du fait de la présence de pucerons vecteurs.

Seules les cultures de semis précoces, situées en terre d'alluvion et de bocage, présentent des infestations de pucerons quelquefois importantes (20 à 25 % des pieds atteints dans la région de SAINT-LOUP).

Si aucune visite de parcelles n'a été réalisée à ce jour,  
il est vivement conseillé de le faire

**ATTENTION :** Observer minutieusement les plants, car les pucerons peuvent se situer à l'intérieur du "bouquet foliaire".

Les conditions climatiques douces actuelles permettent une activité prolongée de ces insectes.

Un traitement peut être encore justifié dans les zones précédemment citées.

Pour plus de précisions, sur les modalités d'intervention et les produits à utiliser, CONSULTER LE BULLETIN N° 29 DU 1er OCTOBRE.

P.221

## RECTIFICATIF

Dans notre bulletin du 7 septembre 1982, sur le tableau des produits utilisables en traitement des semences de céréales, il y a lieu de supprimer l'emploi de l'association à base de nuarimol + manèbe (TRIMISEM TOTAL) sur avoine.

Ces indications nous sont précisées par la firme ELI-LILLY FRANCE.

### BLE D'HIVER

Stades : 1 à 2 feuilles (semis du 15 au 20 Octobre)

### JAUNISSE NANISANTE

Cette maladie peut provoquer des dégâts sur blé. La présence de pucerons vecteurs est pour l'instant pratiquement inexistante.

Une surveillance régulière des cultures est toutefois  
conseillée.

### LIMACES

Quelques dégâts sont observés au cours de la levée, plus particulièrement en sol motteux (feuilles rongées, plantes sectionnées).

La présence de ces mollusques, de moeurs nocturnes, passe souvent inaperçue.

Aussi, la mise en place d'appâts granulés, placés sous des abris divers (tuiles, sacs...) permet de constater éventuellement les cadavres et de décider d'une intervention.

Si nécessaire, utiliser les produits à base de métaldéhyde ou de méthiocarbe.

### INFORMATION AUX ABONNES

Monsieur FARGEIX, Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire AUVERGNE & LIMOUSIN a pris sa retraite à compter du 20 Octobre 1982.

Il est remplacé par Monsieur MORIN précédemment en poste dans la circonscription POITOU-CHARENTES.